

L'ibis chauve se présente

L'ibis chauve – un ibis

L'ibis chauve est un ibis de la taille d'une poule, au plumage noir, aux couvertures alaires teintées de violacé et au long bec courbé. Le bec et les pattes des adultes sont rougeâtres, et la tête est nue, ornée d'une crête noire. Les jeunes ibis chauves ont la tête emplumée. L'ibis chauve a une longévité relativement importante ; il peut vivre jusqu'à 25 ans, voire plus, en captivité.

L'ibis chauve niche en colonies et, sauf dérangement, reste sur son site de reproduction. On rencontre aussi occasionnellement des couples isolés se reproduisant séparément. La taille des colonies varie de quelques couples à de grandes colonies de plus de mille individus, comme c'était le cas à Birecik, sur l'Euphrate (Turquie), jusque dans les années 1950.

Ibis chauve - Recherche de nourriture

Les ibis chauves sont des opportunistes alimentaires très adaptables. Dans les contreforts nord des Alpes, ils se nourrissent principalement de vers de terre, d'insectes et de larves d'insectes, qu'ils dénichent en fouillant le sol avec leur bec sensible.



© Klaus Robin

Les oiseaux cherchent leur nourriture principalement dans les prairies ouvertes à la végétation basse, dans les pâturages dégagés, mais aussi sur les terrains de golf et les aérodromes.

La question théorique de savoir quels habitats alimentaires étaient fréquentés au Moyen Âge par les ibis chauves en Europe centrale revêt une importance secondaire pour le programme de réintroduction en cours, car l'ibis chauve s'adapte parfaitement aux conditions actuelles des prairies fréquemment fauchées.

Ibis chauve – Reproduction

L'ibis chauve a une seule couvée par an. Le nid contient généralement 3 à 4 œufs. L'incubation commence dès la ponte du premier œuf et dure environ quatre semaines. Les poussins éclosent à intervalles réguliers, en fonction du début de l'incubation, en commençant par le premier œuf. Pour les plus jeunes, la lutte pour la nourriture apportée par les parents peut parfois être une question de survie, surtout lorsque les ressources alimentaires sont limitées et que les poussins plus âgés dominent. Les jeunes ibis chauves du Nord prennent leur envol vers l'âge de 45 à 50 jours. Les deux parents participent à l'incubation et à l'élevage des jeunes.



© Rudolf Beck

Ibis chauve – présence historique

La présence de l'ibis chauve en Europe est attestée par des ossements découverts sur des sites préhistoriques et historiques. Des références et des récits écrits figurent dans des manuscrits médiévaux. Cependant, ce corpus d'informations considérable n'était accessible que par le biais de mentions de l'ibis chauve, découvertes plutôt par hasard. Ce n'est qu'avec l'avènement de l'imprimerie au milieu du XVe siècle, coïncidant avec un intérêt croissant pour la nature et ses phénomènes, pour la faune et la flore, que l'ibis chauve commença à être décrit et représenté dans des livres et des imprimés.

De plus, de nombreuses illustrations d'oiseaux datant de différents siècles sont censées représenter l'ibis chauve. La qualité variable de ces illustrations ne permet pas toujours une identification fiable de cette espèce.

AS